

## Aratás előtt vagy tarlón?

Az idei év folyamán az országot járva gyakori kép volt a kései gyomosodás a gabonafélékben, de főleg a búzában. Elsősorban a fenyércirok és a nád jelenléte volt feltűnő az érőfélben lévő gabona táblákban, de helyenként a mezei acat és más évelő fajok is megjelentek. Az említett gyomok hatékony, aratás előtti irtásának lehetőségére felhívtuk a figyelmet a DEKALB hírlevél egy korábbi számában. Az aratás előtti gyomirtásnak több előnye van:

- Csökken az aratáskori szemvesztés.
- A nád levélfelülete szántón a gabonafélékben éri a legnagyobb méretet, így kellő mennyiségű gyomirtó szer tapad meg a leveleken majd kerül a növénybe. A vegetatív fejlődést befejező nád fokozottan szállít tápanyagot a szaporító képletekbe, vele együtt a ROUNDUP MEGA felszívódó hatóanyagát. Emiatt egy kezeléssel több évre kiterjedő hatás érhető el.
- Az aratás megkönnyítése mellett tarlókezelés szintű hatást kaphatunk a fenyércirok, tarackbúza és a mezei acat ellen.

Az aratás már országsszerte elindult, de a munkák tervszerű időzítése mellett még van lehetőség az évelő gyomok irtására. Fenyércirok esetében a védekezést indokolhatja, az hogy a legtöbb fertőzött táblában már bekövetkezett bugahányás. Kezelés híján aratásig életképes magvak képződnek növelve a talaj gyommag készletét.

A jelenlegi száraz időben a ROUNDUP MEGA alkalmazása célszerű, mivel különleges összetételének köszönhetően száraz, meleg időjárási körülmények között is kielégítő hatást képes nyújtani.

### A ROUNDUP MEGA javasolt adagja aratás előtti kijuttatásban

Gyomnövény	Dózis, l/ha
Tarackbúza	2,5
Fenyércirok	3,0
mezei acat	4,0
nád, folyondár szulák	5,0



1. ábra. Fenyércirok bugahányásban. Tarlókezelés szintű hatást kaphatunk ellene, és könnyebb az aratás is. Szákszend. Július 5.



2. ábra. A nád szántón ilyenkor irtható a leghatékonyabban. Kunmadaras. Július 9.



3. ábra. A búzára ránövő, virágzó apró szulák ebben a stádiumban a legérzékenyebb. Nőtincs. Július 2.

Amennyiben más feladatok sürgőssége vagy a 14 napos ételmezés-egészségügyi várakozási idő miatt elmaradt az aratás előtti védekezés, akkor tarlón ajánlatos a kezelésre sort keríteni. A tarlókezelés hatékonyságát döntően befolyásolja a gyomok kihajtása. A száraz, meleg időben, illetve a szárító hatású, lezáratlan tarlópántás után csak részleges a gyomok megjelenése és emiatt nem lesz kielégítő a hatékonyság.

#### **Stratégiák az élő gyomok kihajtásának elősegítésére tarlókezeléshez**

##### **Élő egyszikűek (tarackbúza, fenyércirok, nád)**

- Alacsony tarlóval történő aratás,
- Szalma lehordás,
- A tarlópántás mellőzése,
- Engedni a gyomok növekedését az optimális fejlettségig, majd kezelés ROUNDUP MEGA vagy ROUNDUP FORTE felhasználásával.

##### **Élő kétszikűek:**

- Alacsony tarlóval történő aratás,
- Szalma lehordás,
- Tarlópántás, a talaj azonnali lezárásával,
- Engedni a gyomok növekedését az optimális fejlettségig, majd kezelés ROUNDUP MEGA vagy ROUNDUP FORTE felhasználásával.

