

# ROUNDUP® MEGA TARLÓKEZELÉS

**A JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT HAGYOMÁNYOS ELEME A TARLÓK VEGYSZERES, GYOMIRTÓ KEZELÉSE. AZONBAN A TARLÓKEZELÉS NEMCSAK A GYOMIRTÁSRÓL SZÓL:**

- **Kényelem és hosszú távú hatás:** kiváló lehetőséget nyújt az évelő gyommentesítésre, megkönnyítve a gyomirtást a következő kultúrában.
- **A talaj nedvesség megőrzése:** a talajt szárító, gyomirtó célú mechanikai műveléssel szemben a tarlókezelés kíméli a talaj vízkészletét.
- **Energia takarékoság:** kisebb energia igényű, mint a mechanikai műveletek, csökkentve az üvegházhatást kiváltó széndioxid kibocsátást.
- **Kimélő talajművelést megalapozása:** a terület tisztán tartásával jó alapot nyújt a minimum műveléshez repcében.



**ROUNDUP® MEGA 2,4 l/ha hatása**  
8 nappal a kezelés után.  
A 10-15 centiméteres egyedek teljesen elpusztultak ennyi idő alatt.  
Iregszemcse. 2010 július 6.



**ROUNDUP® MEGA (3 l/ha) hatása**  
a fenyércirokra egy hónappal a kezelés után.  
Balatonvilágos. 2008. szeptember 4.



**ROUNDUP® MEGA (3 l/ha) hatása**  
egy hónappal a kezelés után.  
A fenyércirok rizómái teljesen elrothadtak.  
Balatonvilágos. 2008. szeptember 4.



**ROUNDUP® MEGA 3,2 l/ha hatása.**  
Békéscsaba-Kerek.  
Kezelés: 2002. szeptember 3.  
Fotó: 2003. május 11.

**A nyári gyomirtás nem olyan egyszerű, mint amilyenek tűnik...  
KÖNYVEBBÉ TEHETŐ A MEGFELELŐ TERMÉK KIVÁLASZTÁSÁVAL!**

**1. ROUNDUP® MEGA: biztosítja a gazdálkodó lelki nyugalmát még nehéz időjárási körülmények esetén is:**

A tarlókezelésekre leginkább a gabonafélék betakarítása után kerül sor a nyári hónapokban, amikor az aszályos meleget hirtelen megzavarhatják gyors zivatarok. A változékony és gyakran szélsőséges, nyári időjárás miatt az alkalmazott készítmény rugalmassága és hatékonysága kulcsfontosságú. Kedvező tulajdonságai miatt a ROUNDUP® MEGA belépő a sikeres tarlókezeléshez.


**Esőállóság: Különleges összetételének köszönhetően a ROUNDUP® MEGA hatóanyaga gyorsabban felszívódik és transzlokálódik a kezelt növényekben, mint más hasonló hatóanyagú készítmények, ezért a permetezés után lehulló csapadék kevésbé befolyásolja hatását.**

**Megbízható hatás száraz körülmények között, függetlenül a hőmérséklettől:**


**Az utóbbi időben gyakori, hirtelen kialakuló, szélsőséges időjárási körülmények esetén is biztos hatás várható a készítménytől.**

**Rövid várakozási idő az első talajmunkáig:** A gyors felszívódás és transzlokálódás miatt a talajművelés szükség esetén hamar elkezdhető. Magról kelő gyomok esetében a kezelés utáni napon, míg évelők elleni védekezéskor 3 – 4 nappal a permetezés után. Így hamar „feketén” tartható a tarló, gátolva a kukoricabogár tojásrakását.

**ROUNDUP® MEGA hatása esős körülmények között**  
Chesterfield, 2007, tarackbúza, 6 mm eső, kezelés után 1 órával



**ROUNDUP® MEGA hatása aszályos időben**  
Chesterfield, 2007, tarackbúza, 32 C, 20 % páratartalom



## 2. ROUNDUP® MEGA: széles a gyomirtási spektruma, beleértve a leggyakoribb tarlón előforduló gyomnövényeket:

**Gabona árvakelés:** Leginkább a gabona után következő repcében okoz gondot. Az aratás után elvégzett, majd azonnal lezárt tarlóláhantás elősegíti az egyenletes kelést, amely lehetővé teszi a fertőzés jelentős csökkentését egyszeri ROUNDUP® MEGA kezeléssel.

**Parlagfű:** A gyom elleni védekezés kötelező jellegű. Az idei év folyamán nagy tömegben kelt a gabonafélékben, repcében majd az aratás után gyors növekedésnek indult. Irtása korai stádiumban célszerű, mivel ekkor érzékenyebb és még véletlenül sem képez pollent.

**Tarackbúza:** A május-június-i rügyugalom után, júliustól növekvő és augusztusban magas a tarackon, tarackszegmentumokon található rügyek aktivitása, emiatt a védekezés ekkor a leghatékonyabb.

**Fenyércirok:** A kedvező körülményeknek köszönhetően a fertőzött táblákban gyomnövény nagy tömegben megjelent már aratás előtt, ezért a tarlón kiváló lehetőség nyílik a védekezésre az újra-hajtó gyom ellen. Hasonlóan a tarackbúzához, a fenyércirok rügyaktivitása is magas augusztusban.



**Mezei acat:** Hosszúnappalos növény, augusztusban már kevésbé jellemző a virágos szár. A tarlón képződő nagy levélrósákból nagy mennyiségben szállítódnak az asszimiláták a gyökérbe, velük együtt az ekkor kijuttatott ROUNDUP® MEGA hatóanyaga is.

**Folyondár és sövényszulák:** Tarlón megvárható a legérzékenyebb virágzás körüli állapot.



### A tarackbúza relatív rügyaktivitása

Hunyadi et al. 2000. Gyomnövények,...



### A ROUNDUP® MEGA AJÁNLOTT ALKALMAZÁSMÓDJA TARLÓKEZELÉSBEN:

Gyom	ROUNDUP® MEGA dózis, l/ha	ROUNDUP® FORTE	Időzítés
Gabona árvakelés	1,5	1,5	3-5 leveles
Parlagfű	2	1,5	10-15 cm
Tarackbúza	3	2,5	20-30 cm
Fenyércirok	3-4	3-3,5	30-50 cm
Mezei acat	4	3,5	tőlevélrózsa – bimbós
Csillagpázsit	5	4	20-30 cm
Folyondár szulák, sövényszulák	5	4	virágzás körül

### AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:


**ROUNDUP® MEGA (450 g/l hatóanyag):** aratás előtt, állományszárítás, vetés előtt, tarló, gyümölcs, szőlő.

**ROUNDUP® FORTE (540 g/l hatóanyag):** tarló, mezőgazdaságilag nem művelt területek.

Felhasználás előtt kérjük elolvasni a címkét.

## Tudta-e?

Hogy a ROUNDUP® MEGA előnyeit a különleges Transorb™ Technológia biztosítja, lehetővé téve a hatóanyag gyorsabb felvételét és transzlokációját egészen a gyökércsúcsig.



### Előnyök:

**KIVÁLÓ HATÁS  
30 °C**

**hőmérsékletnél is**

**Jobb esőállóság**

**Korai művelhetőség**

### További információ:

Monsanto Hungária Kft.

Tel.: +36 1 289 3100; Fax: +36 1 289 3131

Email: [informacio@monsanto.hu](mailto:informacio@monsanto.hu)

### Kereskedelmi kérdések:

+36 20 510 1999

### Technikai támogatás:

+36 20 953 1379



**Roundup®**  
**MEGA**